


Soort huidkanker volgens geslacht




Bron: Stichting Kankerregister - cijfers 2021

De meest voorkomende vormen van huidkanker zijn basocellulair carcinoom (BCC), spinocellulair carcinoom (SCC) en melanoom

- ▶ Basocellulaire carcinomen
- ▶ Spinocellulaire carcinomen
- ▶ Melanoom
- ▶ Overige niet-melanome huidkankers

Kennis over preventiemaatregelen tegen de zon – evolutie



Vergeleken met 2021 neemt de kennis af over (bijna) alle preventiemiddelen en hun vermindering op het risico op huidkanker.


Bron: Enquête Ipsos 2023

→ ↘ Significante verschillen ten opzichte van de vorige meting.

stichting
tegen
kanker

Kennis over de gevaren van de zon - evolutie

WAARHEDEN



Verdachte huidvlekken laten controleren, vermindert kans op huidkanker




Herhaardelijke zonnebrand tijdens de kinderjaren heeft invloed op de kans op huidkanker op latere leeftijd



Zonnecrème met hogere factor = langer in de zon blijven

ONWAARHEDEN



Zonnecrème smeren = eindeloos blijven zonnen



1x/dag insmeren met zonnecrème volstaat om zich te beschermen





Je wordt sneller donkerbruin door eerst te verbranden



In de schaduw kan je niet verbranden


Kennis over de gevaren van de zon neemt af: zowel voor de waarheden als voor de onwaarheden is er een negatieve evolutie over de tijd heen.

Kennis over preventiemaatregelen tegen de zon 16-24 jarigen t.o.v. de globale steekproef



De leeftijdsgroep 16-24 jarigen scoort lager ten opzichte van de andere leeftijdsgroep. Vanaf 25 jaar oud is men zeer goed op de hoogte van de maatregelen en hun risico op huidkanker.

Zonnebrand bij kinderen (< 16 jaar) - Evolutie over 10 jaar



Kinderen lijken vaker te verbranden dan voorheen.

Bron: Enquête Ipsos 2023




Significante verschillen ten opzichte van de vorig meting.

stichting
tegen
kanker



Zonnebrand - Evolutie over 10 jaar



Huid is lichtrood geworden

Huid goed rood geworden, ongemakkelijk voelen, pijn tot minimum 12 uur na blootstelling zon

Zwaar verbrand, rillingen, blaren, misselijkheid, koorts

Het aantal Belgen dat zwaar verbrand geraakte door de zon blijft op een hoger niveau, op dit moment beweert 10% van de bevolking dat ze de voorbije 12 maanden zwaar verbrand raakten door de zon.

Bron: Enquête Ipsos 2023



Significante verschillen ten opzichte van de vorig meting.

stichting
tegen
kanker




BUITENWERKERS

FREQUENTIE VAN INFORMATIE

Buitenwerkers geven aan beduidend vaker geïnformeerd te worden over de risico's op huidkanker dan de doorsnee Belg.




KENNIS OVER DE GEVAREN VAN DE ZON



Ondanks die perceptie van beter geïnformeerd te zijn, blijkt kennis over de gevaren van de zon bij buitenwerkers minder goed t.o.v. de doorsnee Belg. Er leven nog vaker foute percepties.


KENNIS OVER PREVENTIEMAATREGELEN



Ook kennis over preventiemaatregelen tegen huidkanker is duidelijk minder goed uitgebouwd bij buitenwerkers.

BUITENWERKERS

BEWUSTZIJN OVER DE GEVAREN VAN ZONNEN




Buitenwerkers zijn zich minder bewust over de gevaren van zonnen en leven negatievere houdingen t.o.v. bruinen sterker onder buitenwerkers.

Bron: Enquête Ipsos 2023



ZONNEBRAND



Het gebrek aan kennis en slechtere attitude, resulteert in het vaker en ernstiger verbranden van buitenwerkers t.o.v. de doorsnee Belg.